柑桔類病害防治藥劑(依植物保護手冊106年11月網路版整理)

				I
劑型與含量	稀釋倍數 (倍)	安全採收期	防治對象	作用機制 代碼
25%溶液	2,000		貯藏性病害	mc7
40%可濕性粉劑	500		綠黴病、貯藏性病 害、褐色蒂腐病(黑點病)	B1
23.6%乳劑	3,000	7	炭疽病	C3
10%溶液	800		潰瘍病	Н3
56%可濕性粉劑	600		潰瘍病	mc1
81.3%可濕性粉劑	1,000		潰瘍病	D3+mc1
37.5%水懸劑	300	-	潰瘍病	mc1
53.8%水分散性粒劑 57.6%水分散性粒劑	400			
	500			
77%水分散性粒劑	700			
	500	6	上 清瘍病	mc1
				un02
7				mc1+A1
	1 1			mc3+A1
				mc3+A1
	1	21		B1
	1 1		流生的 · 启加内 瘡痂病	mc1
40%水分散性粒劑	500			
	1.000			
			瘡痂病	B1
	· · · · · ·			
23%水懸劑		6	瘡痂病	C3
250G/L(25%W/V)水懸 劑	3,000			
50%水分散性粒劑	6,000			
15%可濕性粉劑	3,000	6	瘡痂病	G1
39.5%水懸劑	2,000	10	瘡痂病	C5
39.5%水懸劑	500	10	白紋羽病	CJ
22.7%水懸劑]			mc9
70%水分散性粒劑	1,000	30	褐色蒂腐病(黑點 病)、黑星病	
70%可濕性粉劑				
40%水懸劑※	200		黑星病	mc5
75%水分散性粒劑	500			
50%可濕性粉劑+97%乳	4,000+200		黑星病	B1+NC
	25%溶液 40%可濕性粉劑 23.6%乳劑 10%溶液 56%可濕性粉劑 81.3%可濕性粉劑 37.5%水懸劑 53.8%水分散性粒劑 57.6%水分散性粒劑 77%水分散性粒劑 77%水分散性粉劑 72%濕性粉劑 80%可濕性粉劑 72%濕性粉劑 53%水分散性粒劑 53%水分散性粒劑 53%水分散性粒劑 53%水分散性粒劑 50%可濕性粉劑 50%可濕性粉劑 50%可濕性粉劑 80%可濕性粉劑 50%可濕性粉劑 50%可濕性粉劑 20%水分散性粒劑 40%水分散性粒劑 40%水分散性粒劑 40%水分散性粒劑 40%水影劑※ 70%可濕性粉劑 80%可濕性粉劑 22.7%水懸劑 250G/L(25%W/V)水懸劑 10%水懸劑※ 70%可濕性粉劑 10%水懸劑※ 70%可濕性粉劑 10%水懸劑※ 70%可濕性粉劑 10%水懸劑※ 70%可濕性粉劑 10%水懸劑※ 70%可濕性粉劑 10%水懸劑※ 70%可濕性粉劑 10%水粉劑 70%水分散性粒劑 15%可濕性粉劑 22.7%水懸劑 39.5%水懸劑 39.5%水懸劑 39.5%水懸劑 39.5%水影劑	新翠與含量	新澤色數 安全採收 期	四型與百里

藥劑名稱	劑型與含量	稀釋倍數 (倍)	安全採收期	防治對象	作用機制 代碼
鋅錳乃浦+礦 物油	80%可濕性粉劑+97%乳 劑	650+200		黑星病	mc3+NC
腈硫克敏	16%水分散性粒劑	1,000	21	黑星病	mc9+C3
免得爛	80%水分散性粒劑	500	25	黑星病、炭疽病	mc3
甲基鋅乃浦	70%可濕性粉劑	500	40	黑星病	mc3
鋅錳乃浦	80%可濕性粉劑 33%水懸劑	500	40	黑星病、褐色蒂腐 病(黑點病)	mc3
三氟敏	50%水分散性粒劑	10,000	14	褐色蒂腐病(黑點病)	C3
貝芬硫醌	56%可濕性粉劑	800	30	褐色蒂腐病(黑點 病)	B1+mc9
芬滅松	40%乳劑	2,000			
	10%粒劑	30公斤/公 頃	春芽萌發 時施用	寄生性線蟲	1B
普伏松	10%粒劑	30公斤/公 頃	春芽萌發 時施用	寄生性線蟲	1B
滅線蟲	30%粒劑	28公斤/公 頃	春芽萌發 時施用	寄生性線蟲	1B
托福松	10%粒劑	20公斤/公 頃	春芽萌發 時施用	寄生性線蟲	1B
丁基加保扶	5%粒劑	80公斤/公 頃	春芽萌發 時施用	寄生性線蟲	1A