

臺東區農業改良場

番荔枝病蟲害防治藥劑一覽表-病害

病蟲害診斷服務專線：(089)325-015

作用機制代號 (FRAC)	普通名稱	劑型含量	稀釋倍數	安全採收期 (天)	果腐病 (黑腐病)	炭疽病	疫病	銹病	褐根病、根朽病	容許量標準(ppm)		備註
										臺灣	中國	
4,A1+M1	銅滅達樂	76.5%可濕性粉劑	1,000	12			●			銅 - 滅達樂 0.5	未訂	系統性保護治療劑
1,B1	甲基多保淨	40%水懸劑	500	6	○	●				1.0	未訂	系統性保護治療劑
		70%可濕性粉劑										
11,C3	亞托敏	23%水懸劑	2,000	12	○	●	○	●		1.0	未訂	系統性保護治療除滅劑
		10%水懸劑	800									
		250G/L(25%W/V)水懸劑	2,000									
		50%可濕性粉劑	4,000									
	百克敏	23.6%乳劑	3,000	12	○	●	○	●		0.5	未訂	局部系統性保護治療劑
	三氟敏	43.7%水懸劑	4,000	18	○	●	○	●		0.5	未訂	保護劑
		50%水分散性粒劑										
		500G/L(50%W/V)水懸劑										
44,F6	枯草桿菌 Y1366	50% (1X10 ⁹ CFU/G 以上)可濕性粉劑	800	免訂	●					-	-	保護劑
3,G1	撲克拉錳	50%可濕性粉劑	6,000	9	○	●				1.0	7.0	保護治療除滅劑
	撲克拉	25%水基乳劑	1,000	-					●	1.0	7.0	保護治療除滅劑 限根部使用
		25%乳劑										
	得克利	25.9%水基乳劑	1,500	6	○	●		●		0.5	未訂	系統性保護治療除滅劑
		250 G/L (25% W/V) 水基乳劑										
M1	三元硫酸銅	27.12%水懸劑	800	-			●			免訂	未訂	保護劑

作用機制代號 (FRAC)	普通名稱	劑型含量	稀釋 倍數	安全採 收期 (天)	果腐病 (黑腐病)	炭疽病	疫病	銹病	褐根病、 根朽病	容許量標準(ppm)		備註
										臺灣	中國	
M3	免得爛	80%水分散性粒劑	500	21		●		○		2.5	未訂	保護劑
	鋅錳乃浦	80%可濕性粉劑	400	21		●		○		2.5	未訂	保護劑
M7	克熱淨（烷 苯磺酸鹽）	40%可濕性粉劑	1,500	21		●				0.3	未訂	保護劑
33	福賽得	80%水分散性粒劑	500	21			●			20.0	未訂	系統性保護 治療劑
11,C3 + 7,C2	三氟派瑞	500G/L (50%w/v) 水懸劑	4,000	18	○	●				三氟敏 0.5 氟派瑞 0.8	未訂	保護治療劑
11,C3 +3,G1	亞托待克利	325g/L(32.5% W/V)水懸劑	3,000	21	○	●	○			亞托敏 1.0 待克利 0.5	未訂	系統性保護 治療除滅劑
9,D1 +12,E2	賽普護汰寧	62.5%水分散性粒 劑	1,500	12	●	●				賽普洛 1.0 護汰寧 1.0	未訂	系統性保護 治療劑
			2,000									
43,B5 +12,F5	氟比拔克	60.8%水懸劑	1,000	14			●			氟比來 2.0 普拔克 10.0	未訂	系統性保護 治療劑

備註：

1. A1：RNA 聚合酶 I，鹽基丙胺酸類；B1：有絲分裂微管蛋白聚合，硫脲甲酸類；C3：粒線體電子傳遞複合物Ⅲ細胞色素 bc1(Qo)，甲氧基丙烯酸酯類、甲氧基胺基甲酸酯類、肟乙酸酯類；F6：干擾病原菌細胞膜，微生物製劑；G1：固醇合成之 C14 去甲基酶，咪唑類、三唑類；M1：多重作用部位接觸活性，無機銅類；M3：多重作用部位接觸活性，二硫代胺基甲酸鹽類；M7：多重作用部位接觸活性，胍類；un：未知，亞磷酸酯類。
2. 700 PCU/g 純白鏈黴菌素水溶性粉劑已無有效農藥許可證，故未列入用藥一覽表。
3. 說明：
 - (1) ●：已登記之防治範圍；○：登記於防治其他作物之同類有害生物。
 - (2) 保護性：藥劑在病原菌到達或開始感染前，在植物體表面或體內形成保護障蔽以避免感染發生，又可稱為預防性作用。
 - (3) 治療性：藥劑在植物組織中阻止病原菌在組織的早期生長，在感染之前或感染初期都有效，嚴重時效果較差。
 - (4) 除滅性：作用方式同治療性藥劑，但可防除已出現病徵的病原菌感染。
4. 資料來源等請參「番荔枝病蟲害防治藥劑一覽表-蟲害、草害」備註。