

防治對象	防治方法					
	農藥防治					備註
	使用藥劑種類	公頃用藥量 (公斤或公升)	稀釋倍數	安全採收天數	注意事項	
太平洋臀紋粉介殼蟲	48.34%丁基加保扶乳劑	0.75-1.0	1,000	16天	1. 強剪後發芽前可混合95%夏油100倍。	可兼防治蚜蟲類、蛾類、粉蝨類害蟲。
	20%亞滅培可溶性粉劑	0.4~0.5	2,500	7天		可兼防治蚜蟲、薊馬類、粉蝨類等害蟲。
	24%納乃得溶液	0.75-1.0	1,000	10天	2. 強剪廢棄枝條葉片若無法燒燬時，必須同時徹底防治一次。	可兼防治蚜蟲、蛾類、粉蝨類等害蟲。
	20%達特南可溶性粒劑	0.4~0.5	2,000	15天		可兼防治蚜蟲類、薊馬類、粉蝨類等害蟲。
	75%陶斯松水分散性粒劑	0.3~0.5	3,000	12天	3. 上述各藥劑任選一種。	兼可防治粉介殼蟲、圓介殼蟲、蛾類等害蟲。
葉蟬類 銹蟎	1%密滅汀乳劑	1~1.5	1,500	6天	葉蟬發生時施藥1次。	密滅汀可兼防治蚜蟲類害蟲。
	50%馬拉松乳劑	0.7~1.0	1,000	15天		可兼防治粉蝨蟲、蚜蟲、介殼蟲等害蟲。
	20%畢達本可濕性粉劑	0.4~0.5	2,000	12天		
	10%芬普寧可濕性粉劑	0.7~1.0	1,000	12天		可兼防治蛾類害蟲。
	4%畢汰芬水懸劑	0.4~0.5	2,000	9天		
斑螟蛾	2.4%第滅寧水懸劑	1.0~1.5	1,500	3天	1. 上述各藥劑各任選一種即可。 2. 請於小果期(果徑3-4公分)時使用。	兼防治蚜蟲類、蛾類、東方果實蠅類等害蟲。
	42%益洛寧可濕性粉劑	1.0~1.5	1,500	10天		

番荔枝病蟲害防治方法(摘錄自植物保護手冊)

備註：1. 本表參考 99 年版植物保護手冊，如有疑問請逕上<http://www.tactri.gov.tw/htdocs/ppmtable/>網路版植物保護手冊查詢。

2. 施藥時注意輪流使用不同作用機制的藥劑，避免抗藥性產生。
3. 遵守安全採收期及推薦使用稀釋倍數，避免發生農藥殘留不合格與農藥不當使用造成藥害。
4. 可濕性硫黃粉核准用於防治柑桔與荔枝銹蟎(蟬)，且免訂殘留容許量，可參考使用於防治番荔枝葉蟎及銹蟎(蟬)。