

臺東地區蝴蝶蘭栽培工作曆

月 份		一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二
項 目													
更換栽培介質													
花梗修剪、去除													
老葉、黃葉剪除													
花朵雜交授粉													
花 梗 繁 植													
無 菌 播 種													
施 肥	N:P:K(20-20-20) 2000倍												
	N:P:K(10-30-20) 2000倍												
病 害 防 治	細菌性軟腐病												
	炭疽病及褐斑病												
	交 激 病												
	毒 素 病												
蟲 害 防 治	介 殼 蟲												
	紅 蜘蛛												

主要工作重點說明

1. 防治毒素病，栽培時避免密植，一旦發現病株立即燒燬或嚴子隔離，在剪除老葉花梗時，刀械均需以5%氫氧化鈉(NaOH)消毒一分鐘，可有效遏阻病毒傳播。
2. 蘭園需適度遮蔭，小苗控制在500~1000燭光，成株1500燭光為適。
3. 蝴蝶蘭營養生長期以日/夜溫30/25°C生長最好。
4. 小苗階段栽培介質以水苔為宜，中苗、成株為配合滴灌可用蛇木拌入PP泡棉或人造土皆可，栽培介質中宜添加樹皮堆肥供給有機質，促進植株生長。
5. 施肥方式宜薄施，次數增加，10月~2月每20天滴施一次，3月~9月每10天滴施一次，每30天以微量元素噴施葉面一次。
6. 冬天低溫時，滴灌水時以早上為宜，夏天高溫期，早晚實施皆可。
7. 春末至仲秋，每天滴灌一次為宜。秋末至初春，每二、三天一次，水以能自盆底滲出為度。