

臺東地區梅栽培工作曆

項	月	份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二
整	枝													
修	剪													
施	肥													
採	收													
病	黑 星 病													
害	炭 疽 病													
防	白 粉 病													
治	白 粉 病													
蟲	蚜 蟲													
害	蚜 蟲													
防	蚜 蟲													
治	蚜 蟲													

主要工作重點說明：

1. 整 枝：採開心自然型為佳。
2. 修 剪：夏季以剪除徒長枝和懷枝為主，同時將長果枝做適當程度的修剪，冬季以剪去病蟲害及枯枝為主，修剪下來的枝條應集中燒燬，以免成為病菌感染來源及刺傷工作人員。
3. 施 肥：施肥量依土壤性質、品種、樹齡及氣候等而異，但一般每公頃施用硫酸銨520 公斤、過磷酸鈣330公斤、氯化鉀160公斤，第一次為5－7月施用全量的40%，第二次為11－12月施下預定施肥量的40%，第三次為2－3月施下剩餘的20%。
4. 結實障害：花器及幼果易受低溫為害，收穫後管理不良如早期落葉或肥料不足，或結果過多等均會造成結實障害。
5. 落 果：氮肥過多或過少，強剪定，或連續陰雨天等均會造成落果。