

梅樹

「看到樹梅，就會止嘴乾」——望梅止渴之意。



果梅，以採果食用為主，可釀酒、醃漬、蜜餞、果醬、果汁等



花瓣白色卵形，萼片5裂，雄蕊多數，心皮單一



冬季開花，先花後葉，花單生無梗

小檔案

學名：*Prunus mume*. Sieb. et Zucc.

科名：薔薇科(Rosaceae)桃屬(*Prunus* L.)

英名：Mei, Japanese apricot

別名：梅仔、白梅、梅花、青梅、春梅、烏梅、梅仔根、臺灣梅

性狀：落葉小喬木，老枝條成刺狀，樹皮深褐色有光澤，有縱裂斑紋。葉互生，倒卵形或寬橢圓形，先端銳尖，基部鈍形，細鋸齒緣，葉柄，近頂端有2腺體；具托葉，早落。冬季開花，先花後葉，花單生或簇生，花無梗，瓣卵形，白色、粉紅或深紅色，萼5裂，雄蕊多數，心皮單一。4~5月果熟，核果球形，密被短柔毛，味酸，綠色，一側具有淺溝，未成熟果實及種子有毒。



樹皮深褐色有光澤，有縱裂斑紋



核果球形，密被短柔毛，味酸，綠色，一側具有淺溝



葉互生，倒卵形或寬橢圓形，先端銳尖，基部鈍形，細鋸齒緣

梅樹在臺灣的種植起源於何時？因為沒有紀錄可查，已無從所考，但一般傳說應該是在明鄭時期，由先移民自福建或廣東等地引進。梅樹屬溫帶樹種，在臺灣梅樹大都分布在南投、臺東及臺中等地，另外臺南、高雄及花蓮等地也有栽植，大致上沿中央山脈的兩側，海拔300至1,000公尺的山坡地。

臺灣在冬日裡，是梅花盛開的季節，很多遊客都逐花而往，賞梅勝地以南投風櫃斗、臺南梅嶺、嘉義梅山、桃園角板山、南橫梅山、武陵農場最富盛名，其他還有臺北陽明山、烏來、桃園石門水庫、苗栗南庄、馬拉邦山、臺中東勢林場、南投烏松崙、牛稠坑、水里、梅峰、嘉義阿里山、高雄甲仙錫安山、寶來美瓏山、花蓮天祥梅園、臺東南橫天龍段、鹿野、泰源幽谷等地。至於以梅樹為地名者有各地的梅嶺、嘉義縣梅山鄉、臺中縣石岡鄉梅子村，梅子村還設有梅子車站。

梅花的品種數可達三百餘種，但一般可分為以食用為主的果梅和以觀賞為主的花梅兩種，果梅的花瓣五瓣，色白。花梅大多是重瓣的品種，花色有白色、粉色、紅色、紫色、淺綠色等饒富變化。

梅經常和蘭、菊、竹並列為「四君子」，也和松、竹齊稱「歲寒三友」。在植物的世界裡「春蘭，夏荷，秋菊，冬梅」，各代表著其生長的節令，梅花因著耐寒的特性，成為代表冬季的花卉。每年的三月，都會有「梅雨」季節，在臺灣較為不明顯，但在中國的江南地區，梅雨猶如梅花落花繽紛般不曾終止。

梅和桃及刺桐一樣都是先開花後長葉的植物，為什麼這些植物和其他的植物不同，要「先花後葉」呢？植物的花芽和葉芽在生長的時候，各自對生長溫度的要求會有不一樣，梅和桃及刺桐其花芽生長所需的溫度比葉芽低，所以只要溫度條件吻合，自然花就比葉先開了，反之葉芽須等溫度較高些才會冒出頭來，其實植物的演化，自有其先決條件的需求，而這樣的奧秘，只有留待我們一一去發掘。



唐梅是觀賞性梅花，重瓣花冠，粉紅色