



椿象類 Bug

經調查臺東地區咖啡園，椿象危害多發生於山區或附近雜草樹木較茂密之園區，發生時機有季節性，並以緣椿科危害為主。



一、學名 | 細針緣椿象 *Clentus puntiger* (Dallas)
臺灣蜘蛛緣椿象 *Leptocoris acuta* (Thunberg)



二、別名 | 臭腥龜仔



三、分類 | 半翅目 (Hemiptera)、緣椿科 (Coreidae)



四、害蟲特徵 |

(一) 細針緣椿象：體長 9~11公釐，體色黃褐色，前胸板兩側呈細針狀，腹部背面各節側方具狹條黑斑（圖77）。

(二) 臺灣蜘蛛緣椿象：體、觸角及腳皆細長，體綠色，翅膀膜質部黑褐色，頭及前胸側部具黑線一條（圖78）。



五、危害特徵 | 主要危害嫩葉，以口器刺吸葉片吸取汁液，在刺吸部位造成褐色壞死斑塊、葉片扭曲（圖79），或造成葉片產生小點穿孔（圖80），影響光合作用。



六、發生時期 | 發生時期多集中於3-6月（春季至初夏）。喜陰涼處，附近若有樹林及雜草堆最易發生。



七、防治建議 |

(一) 椿象危害多具季節性，目前並無有效防治方法，若危害情形不嚴重，則不建議防治。

(二) 若在園區大發生時，可架設本場研發之太陽能捕蟲器於田間周圍誘捕（圖81），以紫黑燈效果最佳（圖82）。

圖片
解說

77

細針緣椿象



78

臺灣蜘蛛緣椿象



79

細針緣椿象在刺吸部位造成褐色壞死斑塊，葉片扭曲。



80

臺灣蜘蛛緣椿象危害後造成葉片產生小點穿孔



81

太陽能捕蟲器



82

紫黑燈對椿象誘捕效果最佳